

：郊外常見植物：

大頭茶



大頭茶 (Hong Kong Gordonia) 是香港的常綠小喬木，高三至七米。剝落後的內層呈紅褐色。葉片橢圓形帶鋸齒。花朵很大，白色，花蕊鮮黃色。果實成熟時會裂開，如傘子的種子便隨風飄揚。

紅花羊蹄甲



紅花羊蹄甲 (Purple Camel's Foot) 與宮粉羊蹄甲的外形相似，常令人混淆。其實從兩者的不同開花期便可以識別，紅花羊蹄甲是九至十一月，宮粉羊蹄甲的花期是三至五月。它們的另一分別是紅花羊蹄甲的花瓣呈張開狀，宮粉羊蹄甲的花瓣靠攏在一起。

木麻黃



木麻黃（Horsetail Tree）的外形與松樹相似，容易令人混淆。樹身高大筆直，葉子已退化至鱗片狀，一般人以為樹葉就是那些綠色的針狀物，其實小枝才是木麻黃的葉子，果實呈球狀，堅硬。此樹能抵抗強風和乾旱的天氣。

洋紫荊




中型樹，常綠喬木，樹枝長，向外伸或下垂，花朵由五片深紫紅色的花瓣組成，鮮艷奪目，自 1965 年洋紫荊（Hong Kong Orchid Tree）就被選為香港市花。花期由十一月至三月。

血桐



血桐 (Elephant's Ear) 是本地原生的常綠喬木，高達五米。葉片呈盾形，可達二十多厘米。花期在五至六月，串狀。果實在七至八月成熟，果面滿布綠色軟刺，果皮裂開時會露出種子。它的名字有「血」字，是由於樹液在氧化後會呈血紅色。

酢醬草



酢醬草 (*Oxalis Corymbosa*) 伏地而生，多分枝，葉互生，由三片小葉組成，倒心形，葉柄細長，長五至十毫米。花期是四月，花淡紫紅色。

白楸



白楸（Turn in the Wind）是本地原生小喬木，可高達五米。葉片大多為卵形，底部有兩個腺點來分泌含糖份的液體，吸引小昆蟲來覓食。葉面深綠色，葉底是白色。

細小的白花在三至十月開放，微帶芳香。果實在冬季成熟，表面有淡褐色的毛和柔軟的長刺。其樹皮纖維可製麻繩和麻布袋。

台灣相思



台灣相思（Taiwan Acacia）屬常綠喬木，高可達十五米，枝葉細密。花朵在春末夏初盛放，黃色，絨球狀，細小，但密度高，如金黃色的花海，深褐色的果實在秋季成熟。

耳果相思



耳果相思 (Ear-pod Acacia) 葉片狹長，不易燃燒，有隔火的優點；耐生，在貧瘠的土地上也能快速生長，為香港常見的樹木。四月份的耳果相思會長滿黃色的花球。

鳳凰木



鳳凰木 (Flame of the Forest) 原生在非洲。高大，可達二十公尺以上。喜高溫多日照的環境，必須在陽光充足的地方才能生長得茂盛。花大呈紅色。

五爪金龍



五爪金龍（Gairo Morning Glory）常被誤認為是牽牛花，它的葉子互生，螺旋排列，葉的底部呈心形，花冠合瓣，漏斗或塊狀。

白千層



白千層（Paper Bark Tree）對風及空氣污染的抵抗力很高，並有良好的吸音效果，而且具耐火能力，大火過後，它也能屹立不倒，皆因它的老樹皮不會剝落，而是一層一層的留在樹身，形成厚厚的保護層。其葉可提煉出白樹油，是製造白花油和萬金油等中國傳統藥油的材料之一。

油甘子




油甘子 (Myrobalan) 的葉呈橢圓形，互生，花是黃色，生長在較乾燥的地方，每年四至六月開花。它的葉是傳統枕頭的物料，具透氣作用。

刺葵



刺葵 (Spiny Date Palm)，喬木，香港原生，花期是四月至五月，果期是六月至十月。樹身高大，樹幹強壯。

仙人掌



仙人掌 (Prickly Pear) 叢生，灌木狀，高 0.5 至 2 米。莖直立，下部如圓柱形，其餘的均呈扁平狀，長十五至二十厘米或更長，寬四至十厘米，綠色，生有小瘤體，小瘤體上有銳刺，葉已退化成鱗片狀。花鮮黃色，單生或數朵聚生於頂節的邊緣。

崗薊



崗薊 (Rose Myrtle)，長在坡地和山路旁的小灌木，高 0.5-2 米。春天開花，桃紅色，果子呈暗紫色的杯狀。葉對生，幼枝有短絨毛。

野牡丹



野牡丹 (Common Melastoma)，灌木，高 1-1.5 米。春夏開花，粉紅色，花大，一至五朵聚生在枝頂。葉的兩面均有毛，對生。

毛茛



毛茛 (Blood-red Melastoma)，葉片有一層毛，感覺粗糙，葉片對生，葉面深綠色，背的葉脈呈紅褐色。花瓣五至八片，花大，淡紫紅色；果實表面有一層又幼又彎的硬毛。

芒箕



芒箕 (*Dicranopteris pedata* [Houtt.] Nakaike) 多年生的常綠植物，根莖細長褐色，表面綠色有光澤，葉背白色。

含羞草



含羞草 (*Sensitive Plant*) 多年生草本植物，生於草地及山坡上，花淺粉紅色。葉子互生。被觸摸時，小葉會向上閉合和下墜起來，這是因基部的部分細胞吸水硬脹所致。

錫葉藤



錫葉藤 (Sandpaper Vine) 夏天開白色小花，後結為果實，葉片兩面十分粗糙如沙紙。

金毛狗



金毛狗 (Cibotium Kuo)，根莖粗大，葉的基部小羽片有一側缺乏，形成不對稱的莖葉，被有金色毛茸，具吸水保水的特性。

鐵線蕨



鐵線蕨 (Maidenhair Fern.) 高約二十至五十厘米，葉簇生，葉柄長十至二十五厘米，寬八至二十二厘米。

濕地松




原名愛氏松 (Slash Pine)，常綠喬木，果子呈圓錐形，木質，啡色，種子有翅。葉子呈針形，以二或三條齊生在枝條末端。抗病能力不俗，生長迅速，又能在貧瘠的土地和不佳的環境生長。

象牙花



象牙花（Ivory Coral Tree）屬落葉喬木，樹高可達四米。葉片互生，每片葉有三片小葉，前端尖，底部鈍圓。它三月開花，深紅色；但因未完全綻放的花呈象牙色，故名象牙花。

老鼠勒



老鼠勒（Spiny Bears Breech），紅樹之一，葉的形狀如聖誕花葉，黃綠色，葉邊帶刺，花為白色及帶紫和藍色，花期在一至五月，四至七月結果。

海漆



海漆（Milky Mangrove）屬紅樹品種，生在海岸。葉有長柄，單葉互生。大家觀賞時要小心它的樹汁，有毒，誤觸恐有失明之險，皮膚也紅腫起泡，誤服會引致嘔吐和腹瀉等。

秋茄樹



秋茄樹（Kandelia）是本港最常見的紅樹科植物，紅樹林的常見品種，果實形狀似筆，又名水筆仔。當果實還掛在樹上時，種子已長出胚根。果實落下時，尖的胚根會插進泥土內。如果落在海裡，能浮水的種子會隨水漂流，待退潮時跌在泥土便爭取時間生根生長，孕育期需達八個月呢。

木欖



木欖 (Many-petaled Mangrove) 也是紅樹之一，花片，葉和樹幹都呈暗紅色，古時被人稱為紅樹，紅木樹等。